

KLİNİK ARAŞTIRMA**BİR KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN
HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ
DAVRANIŞLARI İLE SAĞLIK KONTROL ODAĞI
ARASINDAKİ İLİŞKİ**

WORKING IN A PUBLIC HOSPITAL NURSES' HEALTH THROUGH HEALTHY
LIFESTYLE BEHAVIORS RELATIONSHIP BETWEEN LOCUS OF CONTROL

**Bilgen ULAMIŞ
Dilek ÖZMEN**

ÖZET

Amaç: Bu araştırma, ameliyathane ve yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık kontrol odağı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan 223 hemşire oluşturmıştır. Araştırma verilerinin toplandığı tarihlerde izinli ya da raporlu olmayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan tüm hemşireler araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler 2-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) ve Çok Boyutlu Sağlık Kontrol Odağı Ölçeği ile (ÇBSKOÖ) toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS 15.0 programında yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmada hemşirelerin SYBDÖ toplam puanı ortalaması (114,21±17,41) saptanırken diğer alt boyut puan ortalamaları ise kendini gerçekleştirme (33,87±5,65), sağlık sorumluluğu (21,37±4,55), egzersiz (9,49±3,08), beslenme (15,51±3,27), kişiler arası destek (18,37±3,71), stres yönetimi (15,57±3,19) olarak saptanmıştır. ÇBSKOÖ alt boyut puan ortalamalarında ise güçlü alt boyut puan ortalaması (10,44±11,00), iç alt boyut puan ortalaması (13,76±14,10), şans alt boyut puan ortalaması (9,54±9,00) olarak saptanmıştır.

Sonuç: Bu araştırmada hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunurken, ÇBSKOÖ puan ortalamaları ise düşük düzeyde saptanmıştır. SYBDÖ ve ÇBSKOÖ boyutları arasında ise zayıf ya da çok zayıf düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çok Boyutlu Sağlık Kontrol Odağı, Hemşireler, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

SUMMARY

Aim: This study aimed at determining the relationship between the health locus of control and healthy lifestyle behaviors of nurses working at intensive care clinics as well as surgery.

Materials and Methods: The sample of descriptive research was the nurses working at surgery and intensive care units of İzmir Tepecik Training and Research Hospital (n: 223). In this study, the sampling was not specialized as all voluntary nurses present were incorporated into the research other than those who were absent as well as on leave for health consideration

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nöroşirürji. Postoperatif Yoğun Bakım Birimi Hemşiresi, İzmir

(B. Ulaşır)

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Hemsirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa

(Doç. Dr. D. Özmen)

Yazışma: B.Ulaşır

within the dates of data collection. The data were collected between May 2 and May 30, 2014 by means of using Personal Information Form, Healthy Lifestyle Behaviors Scale (HLBS) and Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS). Assessment of data was performed using SPSS 15,0 (Statistical Programme for Social Sciences) package software.

Results: In this study, the total mean of HLBS score was $114,21 \pm 17,41$ while the other means of sub-dimensional scores were $33,87 \pm 5,65$ in self-realization, $21,37 \pm 4,55$ in health responsibility, $9,49 \pm 3,08$ in exercise, $15,51 \pm 3,27$ in nutrition, $18,37 \pm 3,71$ in interpersonal support, and $15,57 \pm 3,19$ in stress management. Regarding to the means sub-dimensional scores of MHLCS, the means scores belonging to the strongest sub-dimension, the inner sub-dimension and the chance sub-dimension were found to be $10,44 \pm 11,00$, $13,76 \pm 14,10$, and $9,54 \pm 9,00$, respectively.

Conclusion: In present study, the healthy lifestyle behaviors of the nurses were moderate, while the mean scores of MHLCS were found to be low. In addition, a poor significance level of correlation between HLBS and MHLCS was found.

Keywords: Healthy Lifestyle Behaviors, Multidimensional Health Locus of Control, Nurses

GİRİŞ

Sađlıklı olmak ve yařamına sađlıklı devam etmek insanın temel haklarından birisidir. Bu hakkın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini temel olarak belirleyen günümüz sađlık bakım politikaları, bireylerin kendi sađlık sorumluluđunun farkında olması ve sađlığını geliştirecek davranışları kazanması üzerinde durmaktadır (1).

Sađlığın geliştirilmesi insanların kendi sađlıkları üzerinde kontrollerini artırabilme ve sađlık düzeylerini yükseltebilme süreci olarak tanımlanmıştır. Sađlığı geliştirebilmek için bireylerin yařam biçimlerini değiřtirmeleri ve sađlıklı yařam biçimi davranışlarını benimsemeleri gerekmektedir (2,3). Sađlıklı yařam biçimi davranışları; yeterli ve düzenli egzersiz yapma, dengeli beslenme, sigara kullanmama, sađlık sorumluluđu, stres yönetimi ve hijyenik önlemleri kapsar (4). Sađlık hizmetlerinde çok önemli rolü olan hemřirelerin sađlığı geliřtirmenin önemini kavramaları, vurgulamaları, bu davranışların kazanılmasında yol gösterici olmaları gerekmektedir (5). Pender'e göre sađlıklı yařam biçimi davranışları; sađlık sorumluluđu, fiziksel aktivite, beslenme, kişilerarası ilişkiler, ruhsal gelişim ve stres yönetimidir. Bu davranışlar; sađlık sorumluluđu, fiziksel aktivite, beslenme, ruhsal gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi olarak gruplandırılmıştır. Çok boyutlu sađlığı geliřtirici yařam biçimi örüntüsünü hemřirelik ve davranış bilimleri bağlamında açıklamak amacıyla Pender, sosyal biliřsel modellerden yararlanarak sađlığı geliřtirme modelini tasarlamıştır. Model ilk olarak 1980'li yıllarda hemřirelik literatürüne girmiřtir (6). Rotter'ın sosyal öğrenme kuramı, davranışçı kuramlarla biliřsel kuramları bütünleřtiren bir kuramdır. Bu kuramda dört tür deđiřken vardır:

davranışlar, beklentiler, davranışların sonuçları ve psikolojik durumlar (7).

Kontrol odađı bu deđiřkenlerden beklentilere ilişkindir. Günümüzde kontrol kavramının, davranışın biliřsel nedenlerinin araştırılmasında önde gelen kavramlardan biri olduđu ve kontrolle ilgili kavramların çok çeřitli sonuçları yordama da deđerli olduđu düşünölmektedir (6). Kontrol odađı, "kiřinin, iyi ya da kötü, kendisini etkileyen olayları kendi yetenek, özellik ve davranışlarının sonuçları ya da şans, kader, talih ve güçlü başkaları gibi kendisi dışındaki güçlerin işi olarak algılaması eğilimi" biçiminde tanımlanır. Kendilerini etkileyen olayların daha çok kendi kontrollerinde olduđu inancını taşıyanlar iç kontrol odađı yönelimi yüksek bireyler, kendilerini etkileyen olaylarda daha çok kendileri dışındaki güçlerin kontrolü olduđu inancını taşıyanlar da dış kontrol odađı yönelimi yüksek bireyler olarak ifade edilir. Kendi davranış ve algılarının doğruluđunu kuřkuya düşürecek dış kaynaklı kanıtlarla karşılařtıklarında iç kontrol odađı yönelimi yüksek bireyler, kendi bireysel inançlarına daha sıkı sarılır. Öte yandan, dış kontrol odađı yönelimi yüksek bireyler, özellikle dış kaynađı "saygın" ya da "uzman" biri olarak algıladıkları zaman, başkalarından ya da dışarıdan gelen baskılara daha kolay boyun eğmektedir (8).

Bu araştırmanın amacı ameliyathane ve yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemřirelerin sađlıklı yařam biçimi davranışları ve sađlık kontrol odađı arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, İzmir Tepecik Eğitim ve Arařtırma Hastanesi ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan 223 hemřire üzerinde oluřturmuř-

tur. Arařtırmada verilerinin toplandıđı tarihlerde izinli ya da raporlu olmayan ve arařtırmaya katılmaya g n ll  olan t m hemřireler arařtırmaya dahil edilmiřtir. Arařtırmaya katılım oranı %92,4(203)' d r. Arařtırmanın verileri, hemřirelere y nelik "Kiřisel Bilgi Formu", Sađlıklı Yařam Biçimi Davranıřları  lçeđi (SYBD ) ve  ok Boyutlu Sađlık Kontrol Odađı  lçeđi ( BSKO ) kullanılarak 2- 30 Mayıs 2014 tarihleri arasında toplanmıřtır. Kiřisel bilgi formu, hemřirelerin tanıtıcı  zellikleri ve yařam alıřkanlıklarına iliřkin sorulardan oluřmuřtur.

SYBD  lçeđindeki sorular, bireyin sađlıklı yařam biçimi ile iliřkili olarak sađlıđını geliřtiren davranıřlarını belirler. 1987 yılında Walker, Sechrist ve Pender tarafından geliřtirilmiřtir.  l ek bireyin sađlıklı yařam biçimi ile iliřkili olarak sađlıđı geliřtiren davranıřlarını  l er. 1996 yılında Nihal Esin tarafından T rk 'ye uyarlanmıř, ge erlilik, g venirlikli   alıřması yapılmıřtır.  l ek, toplam 48 maddeden ve altı alt gruptan oluřmuřtur. Likert tipi ve 4 dereceli (1 puan: hi  bir zaman, 2 puan:bazen, 3 puan:sık sık ve 4 puan: d zenli olarak  l eđin b t n maddeleri olumludur.  l eđin toplam puanı sađlıklı yařam biçimi puanını vermektedir.  l ekten alınan puanların y ksek olması bireyin belirtilen sađlık davranıřlarını y ksek d zeyde uyguladıđını g stermektedir. Esin tarafından T rk leřtirilmiř Sađlıklı Yařam Biçimi Davranıřları  l eđinin g venirlik katsayısı; Cronbach Alpha deđeri 0,91'dir (4).  l eđin bu  alıřma i in Cronbach alpha deđeri 0,90 olarak bulunmuřtur.

Algılanan sađlık kontrol n   l mek amacıyla Walltson, Wallston ve DeVellis tarafından geliřtirilmiřtir.  l eđin A, B ve C formları vardır.  l eđin en sık kullanılan formu A'dır ve bu  alıřma i in A formu kullanılmıřtır.  l ekte yer alan 18 madde, i  sađlık kontrol odađı, g  l  bařkaları sađlık kontrol odađı ve řans sađlık kontrol odađı y nelimlerini deđerlendirmek amacıyla altıřar maddelik    gruba ayrılmaktadır.   sel sađlık kontrol ; bireyin kendi deđerlerinin sađlıđı  zerindeki etkisini  l er. G  l  dıřsal kontrol d zeyi; bireyin sađlıđı  zerinde arkadař, aile, hekim, hemřire vb. kiřilerin etki d zeyini  l er. řans etkisi; bireyin sađlıđı  zerindeki řans, talih, oluruna bırakmıřlık, kadercilik gibi etkilerin d zeyini  l er. Maddelere katılım derecesi, "kesinlikle katılıyorum=5" ten "kesinlikle katılmıyorum=0"a olacak bi imde puanlanmıřtır.  l ekte yer alan 18 madde 3 alt boyutu temsil etmek-

tedir. Her alt boyut altıřar madde  zerinde 0-30 arasında puanlar  retmektedir. Alt  l eklere dair i  tutarlık katsayıları i  sađlık kontrol odađı boyutu i in 0,77, dıř sađlık kontrol odađı boyutu i in 0,67 ve řans sađlık kontrol odađı boyutu i in 0,75'dir.  l eđin eř zamanlı ge erlilik ve ayırt edicilik ge erliliđi ayrıca hesaplanmıřtır.  l ek,  st ndađ-Budak tarafından T rk 'ye uyarlanmıřtır (9).  l eđin bu  alıřma i in Cronbach alpha deđerleri 0,56- 0,77 arasında deđerřmektedir.

Arařtırmanın y r t lmesi i in belirtilen kurumlardan yazılı izin ve  alıřmaya katılan hemřirelerden arařtırmanın amacı anlatıldıktan sonra yazılı onam alınmıřtır. Anket formları hemřirelere mesai saatleri i erisinde dađıtılmıř ve arařtırmacılar tarafından toplanmıřtır. Anketin cevaplamařı ortalama 15 dakika s rm řtur. Elde edilen veriler, SPSS 15,0 programında deđerlendirilmiř ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, sayı-y zde dađılımı), Pearson korelasyon testi ve korelasyon analizi kullanılmıřtır.  statistiksel anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmıř olup, $p < 0,05$ olması durumunda anlamlı bir farklılıđın olduđu, $p > 0,05$ olması durumunda ise anlamlı bir farklılıđın olmadıđı kabul edilmiřtir.

BULGULAR

Arařtırmaya katılan hemřirelerin yař ortalaması $31,68 \pm 5,54$ (18-50)'dir. Hemřirelerin % 82'si (169) kadın, %50,5'i (104) lisans mezunu ve % 54,4'  (112) evlidir. Hemřirelerin % 24,3'  (50) anestezi y đun bakımında  alıřırken, % 28,6'sının (59) toplam 6-10 yıldır  alıřmakta olduđu saptanmıřtır (Tablo 1).

Hemřirelerinin Sađlıklı Yařam Bi imi Davranıřları  l eđi'nin alt boyutları ve toplamından aldıđı puanlar Tablo 2.'de g r lmektedirler. Hemřirelerin kendini ger ekleřtirme alt boyutu puan ortalamaları $33,87 \pm 5,65$ (16-46), sađlık sorumluluđu alt boyut puan ortalamaları $21,37 \pm 4,55$ (11-36), egzersiz alt boyut puan ortalamaları $9,49 \pm 3,08$ (5-19), beslenme alt boyut puan ortalamaları $15,51 \pm 3,27$ (7-24), kiřiler arası destek boyutu puan ortalamaları $18,37 \pm 3,71$ (9-38), stres y netimi alt boyutu puan ortalamaları $15,57 \pm 3,19$ (9-25) olarak saptanırken,  l eđin toplamından aldıkları puan ortalamaları $114,21 \pm 17,41$ (62-165)'dir (Tablo 2).

Tablo 1. Hemřirelere Ait Tanıtıcı Bilgiler

DEMOGRAFIK ÖZELLİKLER		
YAŞ ORTALAMASI	31.68 ±5.54 (18-50)	
	SAYI	%
CİNSİYET		
Kadın	169	82.00
Erkek	37	18.00
EĐİTİM DURUMU		
Lise	35	17.00
Ön lisans	46	22.30
Lisans	104	50.50
Yüksek lisans	21	10.20
MEDENİ DURUM		
Evli	112	54.40
Bekar	81	39.30
Dul/Boşanmış	13	6.30
ÇALIŞILAN BİRİM		
Ameliyathane	33	16.00
Anestezi Yođun Bakım	50	24.30
Cerrahi Yođun Bakım	11	5.30
Çocuk Cerrahi Yođun Bakım	5	2.40
Çocuk Yođun Bakım	13	6.30
Dahiliye Yođun Bakım	10	4.90
Koroner Yođun Bakım	13	6.30
Göğüs Kalp Damar Cerrahi Yođun Bakım	6	2.90
Nöroloji Yođun Bakım	9	4.40
Nörořirurji Yođun Bakım	9	4.40
Yenidođan Yođun Bakım	47	22.80
TOPLAM ÇALIŞMA YILI		
1 yıldan az	8	3.90
1-5 yıl	53	25.70
6-10 yıl	59	28.60
11-15 yıl	39	18.90
16-20 yıl	38	18.40
21 yıl ve üzeri	9	4.40
TOPLAM	206	100.00

Tablo 2. SYBDÖ' nin Alt ve Toplam Puan Ortalamalarının Dağılımı

ÖLÇEK ALT VE TOPLAM BOYUTLARI	MADDE SAYISI	ORT±SS	ORTANCA	EN AZ	EN ÇOK
Kendini gerçekleştirme	13	33.87±5.65	34.00	16.00	46.00
Sađlık sorumluluđu	10	21.37±4.55	21.00	11.00	36.00
Egzersiz	5	9.49±3.08	9.00	5.00	19.00
Beslenme	6	15.51±3.27	16.00	7.00	24.00
Kiřiler arası destek	7	18.37±3.71	18.00	9.00	38.00
Stres yönetimi	7	15.57±3.19	15.00	9.00	25.00
TOPLAM	48	114.21±17.41	114.00	62.00	165.00

Çok Boyutlu Sađlık Kontrol Odađı Ölçeđi'nin alt boyut puan ortalamaları güçlü- 10,44±11,00 (1-19), iç- 13,76±14,10 (0-24), řans- 9,54±9,00 (1-22) olarak saptanmıştır (Tablo 3). Hemřirelerin Çok Boyutlu Sađlık Kontrol Odađı Ölçeđi alt puan ortalamalarına bakıldığında, her üç boyuttan da genellikle düşük puanlar aldıkları görölmektedir. Hemřirelerin en yüksek puan ortalamasına sahip oldukları alt boyut iç alt bo-

yutu olurken, en düşük puan ortalamasına sahip oldukları alt boyut ise řans alt boyutudur.

Hemřirelerin SYBDÖ ve ÇBSKOÖ puan ortalamaları arasındaki iliřkiyi deđerlendirmek için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır (Tablo 4). Analiz sonucunda SYBDÖ'nin alt boyutu olan kendini gerçekleştirme ile SYBDÖ'nin alt boyutlarından iç alt boyutu arasında

pozitif ynde istatistiksel olarak anlamlı ve zayıf bir iliřki saptanırken (r: 0,279, p: 0,000), kendini gerekleřtirme alt boyutu ile řans alt boyutu arasında negatif ynde istatistiksel olarak anlamlı ve ok zayıf bir iliřki saptanmıřtır (r: -0,211, p: 0,002). SYBD sađlık sorumluluđu alt boyutu ile BSKO gl alt boyutu arasında pozitif ynde istatistiksel olarak anlamlı ve ok zayıf bir iliřki saptanmıřtır (r: 0,143, p: 0,041). SYBD beslenme alt boyutu ile BSKO řans alt boyutu arasında negatif ynde istatistiksel olarak anlamlı ve ok zayıf bir iliřki saptanmıřtır (r: -0,210, p: 0,002). SYBD stres alt boyutu ile BSKO i alt boyutu arasında pozitif ynde istatistiksel olarak anlamlı ve ok zayıf bir iliřki saptanırken (r: 0,148, p: 0,033), SYBD stres alt boyutu ile BSKO řans alt boyutu arasında negatif ynde istatistiksel olarak anlamlı ve ok zayıf bir iliřki saptanmıřtır. Toplam SYBD ile BSKO i alt boyutu arasında pozitif ynde istatistiksel olarak anlamlı ve ok zayıf iliřki bulunurken (r: 0,178, p: 0,010), yine SYBD toplam puanı ile BSKO řans alt boyutu arasında negatif

ynde istatistiksel olarak anlamlı ve ok zayıf bir iliřki saptanmıřtır (r: -0,193, p: 0,005). Diđer alt boyutlar arasında anlamlı bir iliřkiye rastlanmamıřtır (p>0,005).

TARTIřMA

zkan ve Yılmaz tarafından yapılan alıřmada hastanede alıřan hemřirelerin sađlıklı yařam biimi davranıřları leđi toplam puan ortalamaları 125.96± 16.99 olarak saptanmıřtır (10). Gner ve Demir tarafından yapılan alıřmada ameliyathanede alıřan hemřirelerin sađlıklı yařam biimi davranıřları leđi toplam puan ortalamaları 116.86±16.30 olarak bulunurken (11), yine Kılı tarafından ameliyathane hemřirelerinin sađlıklı yařam biimi davranıřlarının deđerlendirildiđi alıřmada hemřirelerin sađlıklı yařam biimi davranıřları leđi toplam puan ortalamaları 121.77± 22.55 olarak bulunmuřtur (12). Crcani ve ark. tarafından yapılan alıřmada ise hemřirelerin SYBD toplam puan ortalaması 121.20+18.30'dur (13).

Tablo 3. BSKO'nin Alt Boyutlarının Puan Ortalamalarının Dađılımı

LEK ALT BOYUTLARI	MADDE SAYISI	ORTALAMA ±STANDART SAPMA	ORTANCA	EN AZ	EN OK
İ	6	13.76±4.10	14.00	0.00	24.00
Gl	6	10.44±3.65	11.00	1.00	19.00
řans	6	9.54±3.36	9.00	1.00	22.00

Tablo 4. SYBD Puan Ortalamaları ile BSKO Puan Ortalamaları Arasındaki İliřki

SYBD	BSKO		
	Gl	İ	řans
Kendini gerekleřtirme	r : 0.024 p : 0.735	r : 0.279 p : 0.000	r : -0.211 p : 0.002
Sađlık sorumluluđu	r : 0.143 p : 0.041	r : 0.031 p : 0.661	r : -0.112 p : 0.108
Egzersiz	r : 0.092 p : 0.187	r : 0.136 p : 0.052	r : -0.111 p : 0.111
Beslenme	r : -0.079 p : 0.262	r : 0.103 p : 0.142	r : -0.210 p : 0.002
Kiřiler arası destek	r : 0.037 p : 0.601	r : 0.043 p : 0.540	r : -0.058 p : 0.405
Stres ynetimi	r : 0.083 p : 0.237	r : 0.148 p : 0.033	r : -0.128 p : 0.068
TOPLAM	r : 0.070 p : 0.320	r : 0.178 p : 0.010	r : -0.193 p : 0.005

Bu alıřmadaki bulgular dođrultusunda alıřmaya katılan hemřirelerin orta dzeyde SYBD sahip olduđunu sylemek mmkndr (Tablo 2). Her ne kadar bu alıřmadaki hemřireleri SYBD puan ortalamaları, diđer alıřmaların SYBD puan ortalamalarından biraz daha dřk olsa da, sonular benzerdir. Hastada sađlıklı yařam biimi davranıřlarının geliřtirilip, srdrlmesini sađlamak ve yařam kalitesini ykseltmek hemřirelerin sorumlulukları arasındadır (14). Bu arařtırma sonucunda hemřirelerin kendi sađlıklarını korumak iin gerekli olan sađlıklı yařam biimi davranıřlarını iselleřtirmediklerini sylemek mmkndr. zellikle hemřirelerin daha dřk puan ortalamasına sahip oldukları alanlar olan egzersiz ve beslenme alt boyutları hemřirelerin dzenli egzersiz yapma ve sađlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmadıđını kanıtlamaktadır.

Bu arařtırma sonucunda hemřirelerin ok Boyutlu Sađlık Kontrol Odađı leđi'nin alt boyut puan ortalamaları gl-10,44±11,00, i-13,76±14,10, řans-9,54±9,00 olarak saptanmıřtır (Tablo 3). Hemřirelerin BSKO puan ortalamaları Tabak ve Akkse, řengl ve ark., Kuru, En ve ark. tarafından yapılan alıřmaların puan ortalamalarından olduka dřk saptanmıřtır. Bu sonu zerinde alıřma grubundaki hemřirelerin sađlam bireyler olmasının etkili olduđu dřnlmektedir. Tabak ve Akkse tarafından ergenlerde yapılan alıřmada ve řengl ve ark. tarafından bel ađrılı hastalarda yapılan alıřmada da en yksek puan ortalamasına sahip alt boyut i alt boyutu olurken, en dřk puan ortalamasına sahip olunan alt boyut ise řans alt boyutudur (15, 16). Her iki alıřmanın puanları bu alıřmadan ok daha yksek olsa da, alıřmaların en yksek ve en dřk puan ortalamalı alt boyutları aynıdır. Kuru tarafından koroner arter hastalıđı tanılı bireylerde ve En ve zdemir tarafından hipertansiyonlu bireylerde yapılan alıřmalarda ise en dřk puan ortalamasına sahip alt boyut diđer alıřmalardaki gibi řans alt boyutu olarak saptanırken, en yksek alt boyut ise gl alt boyutu olarak saptanmıřtır (17).

Korelasyon bulguları sonucunda; isel kontrol yksek olan hemřirelerin kendini gerekleřtirmelerinin daha yksek olması, kendini daha yksek dzeyde gerekleřtiren hemřirelerin sađlıkları zerinde řans faktrne ok fırsat vermiyor olabileceđini gsteriyor. Sađlık sorumluluđu yksek olan hemřirelerin gl ynlerinin yksek olması ve bir sađlık problemleri olduđuunda hekim, hemřire gibi sađlık personelinden yardım almaları, beslenme kontrol yksek olan hem-

řirelerin beslenmelerini řans faktrne dayandırma-dıkları grlmřtr. i kontrol yksek olan hemřireler stres kaynaklarını tanıma ve kontrol mekanizmaları ynetimini daha iyi gerekleřtirmişler, stres ynetimini bařarılı bir řekilde yerine getiren hemřireler řans faktr dıřında hareket etmişler, iřleri olurlarına ve kaderciliđe bırakmamışlardır.

SYB davranıřlarını yerine getirmede daha bařarılı olan hemřirelerin isel kontrol dzeylerinin daha yksek olması, SYB davranıřlarını yerine getirmede daha bařarılı olan hemřirelerin bu davranıřlarını iselleřtirerek řansa bırakmamış olmaları beklendik bir durum olarak deđerlendirilmiştir.

SONU ve NERİLER

Bir kamu hastanesinde alıřan ameliyathane ve yođun bakım hemřirelerinin sađlıklı yařam biimi davranıřları ve sađlık kontrol odađı arasındaki iliřkiyi belirlemek amacıyla yapılan bu alıřmada hemřirelerin sađlıklı yařam biimi davranıřlarını orta dzeyde gerekleřtirdikleri ve en yksek oranda puan ortalamasına sahip oldukları alt boyutun kendini gerekleřtirme, en dřk oranda puan ortalamasına sahip oldukları alt boyutun ise egzersiz alt boyutu olduđu saptanmıřtır. Bu arařtırmada hemřirelerin ok Boyutlu Sađlık Kontrol Odađı leđi'nden aldıkları puan ortalamaları diđer alıřma bulgularına gre olduka dřk bulunmuřtur. Hemřirelerin BSKO leđi alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları; en yksek i alt boyutu iken, en dřk řans alt boyutu olarak belirlenmiştir. SYBD ile BSKO arasında ise bazı alt boyutlarda zayıf ya da ok zayıf dzeyinde anlamlı iliřkiler saptanmıştır.

Bu arařtırma sonucunda; Hemřireler ile bu arařtırmada kullanılan her iki lek kullanılarak yeni alıřmalar planlanabilir. Arařtırma sonuları kurum yetkilileri ve alıřmaya katılan hemřirelere duyurulmalıdır. Hemřirelerin zellikle daha dřk oranda gerekleřtirdikleri SYBD gerekleřtirmeleri konusunda desteklenmelidirler (hemřirelerin zellikle nbetleri sırasında daha sađlıklı beslenmelerinin sađlanması, kurumun alıřanların dzenli spor yapabilmelerini sađlayacak spor salonu aması, vs.). zellikle bireylerin sađlıklarının korunması ve geliřtirilmesi konusunda verilecek sađlık eđitimlerinde anahtar role sahip hemřirelerin ncelikle kendi sađlıklarını koruyup geliřtirebilmelerinde destek olabilecek sađlık kontrol odaklarının (zellikle de isel kontrol odaklarını) geliřtirebilmek iin kurumun eđitimler planlaması nerilmektedir.

KAYNAKLAR

1. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Derg 2005; 9(2): 26-34.
2. Owens L. The Relationship Of Health Locus Of Control, Self Efficacy, Health Literacy And Health Promoting Behaviors In Older Adults. A Dissertation Presented Fort He Doctor Of Philosophy Decree The University of Memphis, 2006.
3. Özkütük N, Orgun F. Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Bilgi Transferinin Önemi. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağık Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ankara, 2004:3.
4. Esin N. Endüstriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağık Davranışlarının Saptanması Ve Geliştirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 1997.
5. Whitehead D. Health Promoting Hospitals: The Role And Function Of Nursing. J Clin Nurs 2005; 14(1): 20-7.
6. Pender NJ, Barkauskas VH, Hayman L, Rice VH, Anderson ET. Health Promotion And Disease Prevention: Toward Excellence In Nursing Practice and Education. Nurs Outlook 1992; 40 (3): 106-12.
7. Rotter JB. Internal versus external control of reinforcement: a case history of a variable. American Psychologist 1990; 45 (4): 489-93.
8. Dönmez A. Kontrol Odağı: Temel Araştırma Alanları. Ankara Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi 1986; 19(1): 259-80.
9. Açıköz Çepni S. Üniversite Öğrencilerinde Sağık Yaşam Biçimi Davranışları İle Sağık Kontrol Odağı ve Sağık Öz Yeterliliği İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi, 2010.
10. Özkan S, Yılmaz E. Hastanede Çalışan Hemşirelerin Sağık Yaşam Biçimi Davranışları. Fırat Sağık Hizmetleri Dergisi, 2008; 3 (7): 90-104.
11. Coşkun Güner İ, Demir F. Ameliyathane Hemşirelerinin Sağık Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006; 9 (3) : 17- 25.
12. Kılıç E. Ameliyathane Hemşirelerinin Sağık Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Haliç Üniversitesi. 2012.
13. Cürçani M, Tan M, Özdelikara A. Hemşirelerin Sağık Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010; 9 (5): 487 – 92.
14. Ardahan M, Bayık Temel A. Prostat Kanseri Hastalarda Yaşam Kalitesi ile Sağık Yaşam Biçimi Davranışı İlişkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2006; 22 (2) : 1-14.
15. Tabak R.S, Akköse K. Ergenlerin Sağık Denetim Odağı Algılama Düzeyleri ve Sağık Davranışlarına Etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006; 5 (2): 289- 98.
16. Şengül Y, Kara B, Arda M. N. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Sağık Denetim Odağı ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. Turkish Neurosurgery , 2010; 20 (2): 180-5.
17. Kuru N. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Koroner Arter Hastalığı Tanılı Bireylerin Sağık Davranışlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. 2010.

İLETİŞİM:

Hem. Bilgen ULAMIŞ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir
e-posta: bilgenbilgen@gmail.com
GSM: 0 505 648 19 79