

Serap URAL *
Bahar ÖRMEN*
Figen Kaptan*
Sibel EL*
Nesrin TÜRKER*
Bahriye PAYZİN**
Nejat Ali COŞKUN*

* İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
** İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Anahtar Sözcükler: Enfeksiyöz Mononükleoz, Epstein-Barr Virus, İmmün Trombositopenik Purpura

Key Words: Infectious mononucleosis, Epstein-Barr Virus, Immune Thrombocytopenic Purpura.

İnfeksiyöz Mononükleoz ve İmmün Trombositopenik Purpura: Bir Olgu Sunumu

Infectious Mononucleosis and Immune Thrombocytopenic Purpura: A case report

ÖZET

Epstein-Barr virus (EBV) veya Human Herpes Virus tip 4 (HHV-4), dünya nüfusunun %95'ten fazlasını infekte eden bir gama herpesvirustur. Adölesan ve genç erişkinlerde bu virus ile primer enfeksiyonun en sık klinik formu kendi kendini sınırlayan bir klinik sendrom olan enfeksiyöz mononükleozdur (İM). Çocukluk çağında ise EBV ile enfeksiyon genellikle asemptomatik veya hafif seyirlidir. İmmün trombositopenik purpura (İTP) çocuklarda sıklıkla kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. İmmün sistemin uygunsuz bir cevabı olarak bir viral enfeksiyonu veya immunizasyonu takip edebilir. Yüksek ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik yakınmaları ile hastaneye başvuran 21 yaşındaki kadın hastada, trombositopeni nedenleri araştırılırken İM tanısı kondu. Enfeksiyöz mononükleoza bağlı İTP düşünülerek prednizolon tedavisine alındı. Tedaviye çok iyi cevap veren olguda bir yıllık izlemde nüks saptanmadı.

SUMMARY

Epstein-Barr virus (EBV) or Human Herpes Virus-4 (HHV-4) is a gamma herpesvirus that infects more than 95% of the world's population. The most common manifestation of primary infection with this organism is acute infectious mononucleosis, a self-limited clinical syndrome that most frequently affects adolescents and young adults. Infection with EBV in younger children is usually asymptomatic or mild. Immune thrombocytopenic purpura (ITP) in children is usually a self-limiting disorder. It may follow a viral infection or immunisation and is caused by an inappropriate response of the immune system. In a 21-year old female patient, who admitted to the hospital with the complaints of fever, sore throat and malaise, during the studies for the etiology of thrombocytopenia, infectious mononucleosis was diagnosed. For the treatment of ITP due to infectious mononucleosis, prednisolone was used. The response to the treatment was very good and no relapse was seen in the patient in one-year of follow-up.

GİRİŞ ve AMAÇ:

Akut enfeksiyöz mononükleoz ilk olarak 19. yüzyılda glandüler ateş olarak tarif edilmiştir. 1968 yılında EBV'nun etiyolojik ajan olduğu kanıtlanmıştır. Epstein-Barr virus ayrıca Burkitt lenfoma ile de ilişkilidir (1,2). Enfeksiyon sıklıkla çocukluk döneminde kazanılır ve ömür boyu latend kalır. Adölesan ve genç erişkin döneminde ise İM olarak karşımıza çıkar. Nadir de olsa orta yaş ve yaşlılarda da tarif edilmiştir, bu kişiler genellikle heterofil antikor negatiftir (3,4). Klinik olarak ateş, farenjit, eksüdatif jeneralize lenfadenopati ve hepatosplenomegali ile karakterizedir. Laboratuvar olarak tam kan sayımında lökositoz, lenfositoz (%10'nun üzerinde atipik lenfosit), orta derecede trombositopeni tespit edilir. Ciddi trombositopeni çok

Yazışma adresi:

Dr. Serap URAL

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
E-Mail: serapural@hotmail.com
Gsm: 0532 623 40 96

nadir görülür (1,2).

İmmün trombositopenik purpura retiküloendotelial sistemde immün- bağımlı trombosit yıkımı ile karakterize bir hastalıktır. Antikorla kaplı trombositlerin monositik fagositik sistem tarafından dolaşımdan kaldırılması trombosit yaşam süresini kısaltır. Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan kazanılmış trombosit hastalığıdır. Sebebi genellikle viral infeksiyonlardır. Bu infeksiyonlar içinde İTP'ye sebep olan viruslardan birisi de EBV' dur. İmmunolojik mekanizmada sıklıkla sorumlu antikorlar glikoprotein II b ve III a' dır. Dolaşımdaki bu anti- trombosit antikorlar ölçülebilir, fakat İTP'nin tanı ve tedavisinde yardımcı değildir. Tam kan sayımında hemoglobin, hematokrit, beyaz küre sayısı normaldir ve periferik yaymada atipik hücre görülmez. Kemik iliği (Kİ) incelemesi genellikle gerekli olmaz , ancak lösemiye ekarte etmek gerekirse yapılabilir (5-7).

Bu makalede genç erişkin olgularda İTP ve İM tablolarının birlikteliğine dikkat çekmeyi ve literatür bilgileri eşliğinde İM'un İTP ve diğer hematolojik komplikasyonlarını ve tedavi seçeneklerini irdelemeyi amaçladık.

OLGU

Yirmibir yaşında bayan olgu; ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, halsizlik yakınmaları ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde trombositopeni saptanınca dahiliye kliniğine yatırılmış.

Fizik incelemede ateş 38°C, nabız 88/ dak., kan basıncı 120/70mm Hg, solunum sayısı 22/dak. idi. Bilinç açık, genel durum orta, farinks hiperemik, tonsillalar hipertrofik ve her ikisinin de üzerinde eksüda mevcuttu. Üst damakta peteşiler, boynun her iki yanında yaygın servikal mikrolenfadenopatiler saptandı. Batında iki santim hepatomegali, üç santim splenomegali mevcuttu. Diğer sistem bakıları normal bulundu. Laboratuvar testlerinde sedimantasyon 11 mm/h, tam kan sayımında lökosit 6.200/mm³, hemoglobin 10.7g/dL, hematokrit %31.4, trombosit 7.000/mm³ bulundu. Periferik yaymada nötrofil %41, lenfosit %52 (%18 atipik lenfosit), monosit %7 saptandı. Biyokimyasal testlerde AST 142 U/L, ALT 274 U/L, ALP 251 U/L, GGT 85 U/L idi. Tam idrar tahlilinde idrar mikroskobisinde her sahada 15-20 eritrosit görüldü. Olgudan ateşli dönemde boğaz, kan ve idrar kültürleri alındı. Akut

hepatit göstergeleri (HBsAg, Anti HBc IgM, Anti HAV IgM ve anti HCV), TORCH testleri (toxoplazma, rubella, sitomagalovirus, herpes IgM) istendi ve negatif bulundu. Mono-Spot test ve anti- VCA- IgM bakıldı. Her iki test de pozitif geldi. Boğaz kültüründe flora bakterileri üredi, idrar ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Akciğer grafisi normal bulundu. Batın ultrasonografisinde karaciğer boyutu 164mm olup, konturu düzgün, parankimi homojen, safra kesesi normal, dalak boyutu 166mm olup, parankimi homojen tespit edildi.

Yatışının 3. gününde göğüs ağrısı gelişen olguya kardiyolojik komplikasyon açısından kardiyoloji konsültasyonu istendi. Çekilen EKG ve EKO' da bir patoloji saptanmadı. Olguya 4 ünite aferez trombosit, 12 ünite randomize trombosit solisyonu verilmesine rağmen trombosit sayısı 8.000/mm³'nin üzerine çıkmayınca hematoloji kliniği ile konsülte edildi, İM'a bağlı İTP düşünülerek 1mg/kg/gün İV prednisolon tedavisi başlandı. Trombosit değerleri birkaç gün içinde yavaş yavaş yükselerek normal değerine ulaştı. Yedinci günden itibaren kortikosteroid tedavisi orale geçildi.

Ateşi düşen, genel durumu düzelen, boğazdaki eksüda ve peteşileri ve hematürisi kaybolan , trombosit sayısı 157.000/mm³'ne yükselen, karaciğer fonksiyon testleri normale dönen olgu taburcu edildi. Kortikosteroid dozu basamaklı olarak azaltılarak 30 günde kesildi. On gün sonrası poliklinik kontrolünde hiçbir yakınması olmayan, tam kan sayımı normal bulunan olgu 3 ayda bir hemogram baktırması önerilerek bir yıllık takibe alındı.

TARTIŞMA

İnfeksiyöz mononükleoz dünyada yaygın olarak erken çocukluk ve geç adölesan dönemde görülen, sıklıkla subklinik seyirli bir viral infeksiyondur. Haftalar, aylar içerisinde sekelsiz olarak iyileşebildiği gibi, nadiren nörolojik, hematolojik, hepatik, renal, kardiyak, pulmoner ve psikolojik komplikasyonlar ile de seyredebilir. Hematolojik komplikasyonlardan otoimmün hemolitik anemi %0,5-3 oranında, İTP ve hemofagositik sendrom ise %1'den daha az oranda görülür. Ciddi trombositopeninin arkasından aplastik anemi ortaya çıkabilir (2, 8-11).

Akut İM' da tedavi semptomatiktir. Lenfbezi

hipertrofisine bağlı üst solunum yolu obstrüksiyonlarında, ciddi trombositopenide, hemolitik anemide kortikosteroid tedavi uygulanır. Komplikasyonu olmayan İM'da antiviral tedavinin yararı gösterilememiştir, ancak interstisiyel pnömonide asiklovir kullanılmıştır. Otoantikorlara bağlı gelişen ve kortikosteroidlere cevap vermeyen komplikasyonlarda intravenöz immunglobulinler, anti D immunglobulin, antitimosid globulin kullanılmaktadır (9, 12-14).

Akut İM geçiren 29 yaşında bir erkek olgu başka hiçbir klinik bulgu olmadan, sadece ciddi trombositopeniye bağlı kanamalarla hastaneye yatırılmış ve oral steroid tedavisi ile çok iyi sonuç alındığı bildirilmiştir (15). Aynı şekilde tek bulgusu akut ciddi trombositopeni olan 21 yaşında bir erkek olgu da intravenöz metilprednizolon ile tedavi edilmiş ve sonradan ITP' nin İM' a bağlı olduğu anlaşılmıştır (11). Olgumuz da önce akut trombositopeni tablosu ile dahiliye kliniğine yatırılmış, verilen trombosit solüsyonlarına bir cevap alınamayınca otoimmün trombositopeni düşünülerek viral infeksiyonlar araştırılmıştır. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonu sonucu yapılan testlerde İM' a bağlı ITP geliştiği saptanınca infeksiyon hastalıkları kliniğine nakil alınmış, hematoloji kliniğinin önerisi ile intravenöz kortikosteroid tedavisi verilmiştir. Nadir görülmekle birlikte akut trombositopenilerin ayırıcı tanısında İM mutlaka akla gelmelidir.

Akut EBV infeksiyonu geçiren 190 çocuk olgu komplikasyonlar yönünden incelenmiş, %17,9 pulmoner komplikasyon, %5,8 ITP, %2,6 viral miyokardit, %2,6 viral ansefalit, %1,6 hemofagositik sendrom tespit edilmiştir. EBV infeksiyonlarının çok değişik klinik bulgularla seyredebildiği ve komplikasyonlara müdahale için erken tanının önemli olduğu vurgulanmıştır (8). Yenicesu ve ark .(16) Hacettepe Üniversitesi Çocuk Kliniği'ne yatan akut ITP olgularını incelemişler; %13,3 olguda sebebin viral olduğunu (HIV, CMV, EBV, VZV, mumps, rubeola, parvovirus) tespit etmişlerdir.

Takahaski ve ark.(17) İM' a bağlı ciddi immün trombositopenili bir olguyu metilprednizolon ile başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini bildirmişlerdir.

Hsiao ve ark.(18) Taiwan'da 1990-98 yılları arası ITP tanısı ile izlenen 108 adet çocukta EBV göstergelerini incelemişler, EBV ile ilişkili ITP %32,4 oranında saptanmıştır. Taiwan EBV için endemik bir bölgedir, 2-3 yaş arası sağlıklı çocuklarda anti-VCA pozitiflik oranı %65-87 gibi

yüksek bir orandadır. Bu yüzden EBV ile ilişkili ITP oranı da yüksektir. Cyran ve ark. (10), ciddi trombositopeni gelişen 5 İM'lu olguya başlangıçta 1mg/kg/gün oral prednizolon tedavisi uygulamışlar, ancak 6. gün hala trombosit sayısı düşük bulunduğu veya kanama semptomları arttığı için intravenöz gamaglobulin (IVIG 400mg/kg/gün 2-5 gün) tedavisine geçmişler ve hızlı bir trombosit cevabı aldıklarını belirtmişlerdir. Kortikosteroidlere refrakter olan ITP'lerde IVIG önerilmektedir (19).

Bir başka çalışmada EBV ile ilişkili ITP'li bir olguda plazmada anti-trombosit antikorları (glikoproteinler GP IIb/IIIa ve GP Ib /IX) tespit edilmiş ve IVIG tedavisinin etkili olduğu bildirilmiştir (14). Olgumuzda kortikosteroid tedavisi ile hızlı bir trombosit cevabı alındığı için IVIG tedavisine gerek görülmedi.

Atipik seyirli İM' a bağlı ITP'li çocuk olgularda lenfosit subtiplerinin araştırılmasının tanıda faydalı olduğu bildirilmiştir (20). Olofinboba ve ark. (13), İM'a bağlı ciddi trombositopenili bir olguyu anti-D immün globulin ile başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini bildirmişlerdir.

İM' da ölüm çok nadirdir. Christensson ve ark. (21)'nın fulminan seyir gösteren bir olgusunda EBV ile ilişkili hemofagositik sendrom tanısı otopside konmuştur.

İM geçiren iki çocuk olguda akut ITP bulgularının ardından pansitopeni gelişmesi üzerine anti-timosit globulin tedavisi uygulanmış ve komplet remisyon sağlandığı bildirilmiştir (12).

Aynı şekilde Sevilla ve ark. (22)'nin takip ettiği ciddi otoimmün hemolitik anemi, otoimmün trombositopeni ve fatal otoimmün hepatit gelişen İM'lu bir kız çocuğu yoğun immünsüpresif tedavi ve acil karaciğer transplantasyonuna rağmen kurtarılamamıştır. Sıklıkla asemptomatik seyreden hastalığın çok nadir de olsa ölümcül otoimmün komplikasyonlara yol açabileceğine dikkat çekilmiştir.

Sonuç olarak, akut başlangıçlı İTP olgularına viral infeksiyonlar, özellikle de EBV neden olabilmektedir. Tanı ne kadar erken konur ve uygun tedavi ne kadar erken başlanırsa sonuçlar o derece yüz güldürücüdür. Bu nedenle akut İTP'lerin ayırıcı tanısında IM mutlaka düşünülmelidir.

KAYNAKLAR

1. Tosato G, Taka K, Angiolillo AL, Sgadari C. Epstein-Barr virus as an agent of haematological disease. *Baillieres Clin Haematol* 1995; 8:165-199.
2. Johannsen EC, Schooley RT, Kaye KM. Epstein- Barr virus (Infectious mononucleosis). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. *Principles and Practice of Infectious Diseases*. Churchill-Livingstone Philadelphia. 6.ed. 2005:1801-1820.
3. Straus SE, Cohen JI, Tosato G, Meier J. Epstein-Barr virus infections: biology, pathogenesis, and management. *Ann Intern Med* 1993;118:45-58.
4. Hickey SM, Strasburger VC. What every pediatrician should know about infectious mononucleosis in adolescents. *Pediatr Clin North Am* 1997; 44:1541-56.
5. Gernsheimer T. Epidemiology and pathophysiology of immune thrombocytopenic purpura *Eur J Hematol* 2008; 69: 3-8.
6. Godeau B, Provan D, Bussel J. Immune thrombocytopenic purpura in adults. *Curr Opin Hematol* 2007;14:535-56.
7. Goddis AE, Balduini CL. Diagnosis of immune thrombocytopenic purpura in children. *Curr Opin Hematol* 2007;14:520-525.
8. Li ZY, Lou JG, Chen J. Analysis of primary symptoms and disease spectrum in Epsters-Barr virus infected children. *Zhonghua Erkeza Zhi* 2004; 42: 20-22.
9. Jenson HB. Acute complications of Epstein- Barr virus infectious mononucleosis. *Curr Opin Pediatr* 2000;12:263-268.
10. Cyran EM, Rowe JM, Bloom RE. Intravenous gammaglobulin treatment for immun thrombocytopenia associated with infectious mononucleosis. *Am J Hematol* 1991;38:124-129.
11. Likic R, Kazmanic D. Severe thrombocytopenia as a complication of acute Epstein-Barr virus infection. *Wien Klin Wochenschr* 2004;116: 47-50.
12. Weinblatt ME. Immune thrombocytopenic purpura evolving into aplastic anemia in association with Epstein-Barr virus infection. *Am J Pediatr Hematol Oncol* 1191;13: 465-469.
13. Olofinboba KA, Greenberg BR. Successful treatment of infectious mononucleosis-associated immun thrombocytopenic with WinRho anti-D immunoglobulin complicated by severe hemolysis. *Am J Hematol* 2000; 65-178.
14. Tanaka M, Kamijo T, Koike K, Heno I, Nakazawa Y, Kurokawa Y, Sakashita K, Komiyama A, Fujisawa K. Specific autoantibodies to platelet glycoproteins in Epstein-Barr virus associated immune thrombocytopenia *Int J Hematol* 2003; 78:168-170.
15. Sheehan T, Mc Clymonth L, O'Donnell JR. Infectious mononucleosis presenting as thrombocypenic haemorrhage. *Scott Med J* 1986; 31:116-117.
16. Yenicesu I, Yetgin S, Özyürek E, Aslan D. Virus associated immun thrombocytopenic purpura in childhood. *Pediatr Hematol Oncol* 2002;19: 433-437.
17. Takahaski T, Hamasaka N, Harada S, Sugawara N, Yoshimoto M. Methylprednisolone pulse therapy for severe immune thrombocytopenia associated with infectious mononucleosis. *Am J Hematol* 2007; 82: 416-417.
18. Hsiao CC. Epstein-Barr virus associated with immune thrombocytopenic purpura in childhood: A retrospective study. *J Pediatr Child Health* 2000; 36: 445-448..
19. Cines DB, Blanchette VS. Immune thrombocytopenic purpura. *N Eng J Med* 2002; 346: 995-1008.
20. Kanegane H, Miyawaki T, Iwai K, Tsuji T, Taniguchi N. Acute thrombocytopenic purpura associated with primary Epstein-Barr virus infection. *Acta Pediatr Jpn* 1994; 36: 423-426.
21. Christensson B, Braconier JH, Winqrist I, Relander T, Dictor M. Fulminant course of infectious mononucleosis with virus associated hemophagocytic syndrome. *Scand J Infect Dis* 1987; 19: 373-379.
22. Sevilla J, del Carmen Escudero M, Jimenez R, Gonzales-Vincent M, Manzanares J, Garcia Novo D, Modeno L. Severe systemic autoimmune disease associated with Epstein-Barr virus infection. *Pediatr Oncol Hematol* 2004; 26: 831-833.